

国家林草局审（认）定林草良种名录（适宜种植范围包含贵州）

良种名称	良种编号	树种（草种）	类别	公告日期	审（认）定	有效期限	主要完成单位	品种特性	适宜种植范围	主要用途
黄平林场第一代马尾松种子园	国S-SS0(1)-PM-005-2003	马尾松	种子园	2003年12月26日	审定	长期	黄平县国有林场	种子纯度96%，千粒重11.9克，发芽率96.7%，造林成活率98%；生长快，郁闭在，干形圆满通直，大径材比例大；材积遗传增益达30%，干形改良27%以上。	贵州、湖南、浙江、江西各省	/
‘黔南’，山麦冬	国S-WDV-LS-015-2020	山麦冬	野生驯化品种	2021年2月3日	审定	长期	贵州省草业研究所、四川省草原科学研究院	百合科山麦冬属多年生草本。具地下茎，花期株高 50-70 cm。叶基生，叶长 30-68 cm，叶宽 4-8 mm。千粒重 56.5 g，种子产量 900 kg/hm ² 。喜温暖湿润气候，肥沃土壤上生长良好。四季常绿，具多数花，花淡紫色，6 月初花葶出现，7 月初为盛花期，花序观赏期 56 d 以上。	适宜亚热带中低海拔地区及相似气候区种植。	观赏草，主要用于风景林下，公路复层绿化带以及城市公共绿地和庭院绿化。
‘雷司令’，白三叶	国S-IV-TR-016-2020	白三叶	引进品种	2021年2月3日	审定	长期	云南农业大学	豆科车轴草属多年生草本。匍匐枝长而发达，草层高 40-60 cm。头型总状花序，含白色小花 30-80 朵，种子黄色心形，直径 1.0-1.2 mm，千粒重 0.5-0.6 g。喜温凉湿润气候，尚能耐荫，生育期 299 d。粗蛋白含量 21.6%，每年可刈割 4-6 次，干草产量可达 6000-8000 kg/hm ² 。	适宜南北方温和湿润气候区种植，南方适宜海拔 800 m 以上，降雨量 650-1500 mm 温和湿润地区种植。	牧草、生态修复草兼用，主要用于混播人工草地建设、生态修复以及景观绿地营造。

良种名称	良种编号	树种(草种)	类别	公告日期	审(认)定	有效期限	主要完成单位	品种特性	适宜种植范围	主要用途
‘克朗德’白三叶	国 S-IV-TR-017-2020	白三叶	引进品种	2021年2月3日	审定	长期	四川省草业技术研究推广中心、西南民族大学、凉山彝族自治州畜牧站、四川农业大学	豆科车轴草属多年生草本。匍匐枝长而发达，草层高 30-60 cm。头型总状花序，含白色小花 30-80 朵，种子千粒重 0.5-0.6 g，生育期 298 d 左右。粗蛋白含量 21.4%，年可刈割 4-5 次，干草产量 7400-8700 kg/hm ² 。	适宜在长江中上游地区海拔 600 m 以上，年降雨量 1000 mm 以上的温凉湿润地区或相似气候区种植。	牧草、生态修复草兼用，主要用于混播人工草地建设、生态修复以及景观绿地营造。
‘百诺达’多年生黑麦草	国 S-IV-LP-018-2020	多年生黑麦草	引进品种	2021年2月3日	审定	长期	四川农业大学、百绿(天津)国际草业有限公司	多年生冷季型草本。须根系，株高 80-100 cm。叶片长 10-18 cm，穗长 15-25 cm，种子长 4-7 mm，千粒重 1.9 g。利用时间长达 3-5 年，每年可刈割 4-5 次，年平均干草产量 10500kg/hm ² ，第一次刈割粗蛋白含量 20.7%。	适宜我国西南地区亚热带海拔 800-2500 m，降雨量 800-1500 mm 的温凉湿润山区种植。	用作牧草，主要用于混播人工草地建植，刈割或放牧利用。
‘兰箭1号’春箭筈豌豆	国 S-BV-VS-001-2021	春箭筈豌豆	育成品种	2021年10月21日	审定	长期	兰州大学	播前深耕施肥，5 月上旬播种，播前进行根瘤菌拌种。播深 3-4 cm。收种田宜采用条播，行距 30 cm，播种量 30 -35 kg/hm ² ；收草田，条播或撒播，单播播种量为 120-150 kg/hm ² ；与燕麦混播，播种量是单播的 40%-50%。出苗后 30 天除草 1 次，分枝至现蕾期可灌溉 1-2 次。盛花期刈割，头茬草刈割时留茬高度 5-10 cm。	适合在我国温带地区，尤其是青藏高原、黄土高原和云贵高原地区种植。	生态修复草和牧草兼用，主要用于退化草地及传统农区改土肥田，也可与燕麦混播建植一年生人工草地。
‘武陵’假俭草	国 S-WDV-EO-008-2021	假俭草	野生驯化品种	2021年10月21日	审定	长期	四川省草原科学研究院、四川农业大学、江苏农林职业技术学院、贵州大学	禾本科多年生暖季性草本。植株低矮，高 10-20 cm，茎秆基部直立，叶片常基生，叶长 2-8 cm，叶宽 1.5-4 mm，密度 81.3 个/100 cm ² 。在成都地区生育期 210 天左右，绿期 290-300 天。匍匐茎发达，修复效率高，按 15-20 cm 株行距栽植，70 天左右盖度可达到 75% 以上。	适宜我国西南地区及长江中下游海拔 1500 m 以下区域种植。	主要用于边坡生态修复、水土保持及低养护绿化。

良种名称	良种编号	树种(草种)	类别	公告日期	审(认)定	有效期限	主要完成单位	品种特性	适宜种植范围	主要用途
‘小哨’ 马蹄金	国 S-WDV-DR-009-2021	马蹄金	野生驯化品种	2021年10月21日	审定	长期	四川农业大学、云南农业大学、成都时代创绿园艺有限公司	旋花科马蹄金属多年生草本。草层低矮，平均高度 2.39 cm，以匍匐茎分枝繁殖，主匍匐茎长近 20 cm，节着地生根，节间短，长度约 1.1 cm。观赏部分由叶柄和叶片构成，叶片近似圆形，呈马蹄状，翠绿色。全年绿期，最佳观赏期 6-8 月。	适宜我国西南地区及长江中下游海拔 2000 m 以下区域种植。	主要用于城市绿化、观赏草坪及水土保持等。
‘川西’ 斑茅	国 S-WDV-EA-010-2021	斑茅	野生驯化品种	2021年10月21日	审定	长期	四川省草原科学研究院、贵州省草业研究所	禾本科多年生高大丛生草本。主根不明显，须根系发达，茎秆直立粗壮，高 4.3-5.8m，茎粗 14.8-32.3 mm，茎节数 13-21 个，单株分蘖数 180-256 个。适应性强，极粗生，各类土壤均能生长。纤维素含量 33.28%，乙醇转化率 170.9 g/kg，TS 甲烷转化率 80.63 ml/g。	适宜我国西南、华南和华中热带和亚热带地区种植。	能源草和生态修复草兼用，可直接作为燃料，也可用于生物乙醇或生物甲烷转化，还可用于固土护坡、水土保持等。
‘梦龙’ 燕麦	国 S-IV-AS-013-2021	燕麦	引进品种	2021年10月21日	审定	长期	四川省草原科学研究院、北京百斯特草业有限公司	禾本科一年生草本。根系发达，茎秆粗壮直立，株高 130-185 cm。分蘖能力强，分蘖数达 792.6 个/m ² 。对土壤要求不严，适于凉爽湿润气候区种植，在四川红原地区生育期 134 天。干草产量 9761.3-13299.37kg/hm ² ，种子产量 2220.6-3785.6 kg/hm ² ，粗蛋白含量 9.45%-12.6%。	适宜川西、甘南等青藏高原东部、北方冷凉地区以及南方农区冬闲田种植。	主要作饲草刈割利用。用于牧区高产人工草地建植、卧圈种草及南方农区冬闲田种草，也用作多年生草地建植的保护草种。
‘福瑞至’ 燕麦	国 S-IV-AS-014-2021	燕麦	引进品种	2021年10月21日	审定	长期	四川农业大学、四川省草原科学研究院、北京正道农业股份有限公司、山东省畜牧总站	禾本科一年生草本。根系发达，株型紧凑，茎秆粗壮直立光滑，株高 130-185 cm。叶片宽大，叶长 3.5-56.7 cm。晚熟品种，在成都平原秋季种植生育期 232 天。干草产量为 9784-15008 kg/hm ² ，种子产量为 2410-2583 kg/hm ² ，粗蛋白含量为 10%-15%。	适宜我国西南农区、青藏高原海拔 3500 m 以下地区及北方相似生态区种植。	主要作饲草刈割利用。用于西南农区草田轮作、高原牧区一年生人工草地建植，也可作为多年生草地建植当年的先锋草种等。

良种名称	良种编号	树种(草种)	类别	公告日期	审(认)定	有效期限	主要完成单位	品种特性	适宜种植范围	主要用途
‘云甜1号’甜龙竹	国 S-SV-DB-016-2021	竹	品种	2022年1月25日	审定	长期	西南林业大学	秆高 15-25m, 直径 12-18cm, 节间长 30-40cm; 秆型通直, 枝下高大于 3m, 秆基部箨片直立, 幼秆基部具有明显的条纹状灰白色绒毛; 最早于 6 月上旬即开始发笋, 每丛发笋可达 15 头, 粗蛋白质含量 2.10%, 鲜味氨基酸含量 0.476%, 甜味氨基酸含量 0.145%, 芳香族氨基酸含量 0.031%, 粗脂肪含量 1.94%; 单笋平均鲜重 3.3kg, 产笋量可达 16335kg/hm ² 。	云南南部, 广西、贵州等竹适宜栽培区。	食用油料树种。
‘华金’油茶	国 S-SV-CO-017-2021	油茶	品种	2022年1月25日	审定	长期	中南林业科技大学	树体生长旺盛, 树冠纺锤形; 10 月中下旬为始花期, 11 月上旬为盛花期; 果实青色, 椭圆形; 种籽数 6-10 粒, 鲜出籽率 36.38%, 百粒重 220.82g, 干籽含油率 46.0%, 油酸含量 81.65%, 亚油酸含量 9.22%, 棕榈油酸含量 6.14%, 硬脂酸含量 2.20%。盛产期平均产油可达 930kg/hm ² 。	湖南、湖北、河南、广东、广西、贵州、江西等油茶适宜栽培区。	食用油料树种。
‘华硕’油茶	国 S-SV-CO-018-2021	油茶	品种	2022年1月25日	审定	长期	中南林业科技大学	树冠圆头形, 树体紧凑; 果实成熟时黄色, 种籽数 12-18 粒, 鲜出籽率 42.36%, 百粒重 250.0g, 干籽含油率 41.71%。油酸含量 89.89%, 亚油酸含量 7.77%, 盛产期平均产油可达 1023kg/hm ² 。	湖南、湖北、河南、广东、广西、贵州、江西等油茶适宜栽培区。	食用油料树种。
‘华鑫’油茶	国 S-SV-CO-019-2021	油茶	品种	2022年1月25日	审定	长期	中南林业科技大学	树体生长旺盛, 树冠自然圆头; 果形扁圆形, 青黄色, 种籽数 7-15 粒, 鲜出籽率 52.56%, 百粒重 310.37g, 干籽含油率 39.97%; 油酸含量 88.90%, 亚油酸含量 8.38%, 亚麻酸含量 0.06%, 硬脂酸含量 1.46%。盛产期平均产油可达 900kg/hm ² 。	湖南、湖北、河南、广东、广西、贵州、江西等油茶适宜栽培区。	食用油料树种。

注：本表统计由国家林草局审(认)定且适宜种植范围包含贵州的林草良种名录，公告日期范围为2003年12月26日至2022年1月25日。