

附表1

贵州省推荐草种清单

| 草地建植分区 | 涉及行政区 | 主推生态草种 | | 主推牧草草种 | | 备注 |
|----------------|---|-----------|---|-----------|--|--------------|
| | | 种 | 学名 | 种 | 学名 | |
| 高海拔区(1500 m以上) | 毕节市威宁县、赫章县、纳雍县、七星关区、大方县、织金县，六盘水市钟山区、水城区、六枝特区、盘州市，黔西南州普安县、晴隆县、兴义市、兴仁市，遵义市桐梓县、绥阳县、正安县、道真县，安顺市关岭县，黔南州龙里县、贵定县等县(市、区)的部分地区 | 鸭茅 | <i>Dactylis glomerata</i> L. | 鸭茅 | <i>Dactylis glomerata</i> L. | |
| | | 多年生黑麦草 | <i>Perennial Ryegrass</i> | 多年生黑麦草 | <i>Perennial Ryegrass</i> | |
| | | 球茎草芦 | <i>Phalaris tuberosa</i> cv. <i>Weining</i> | 多花黑麦草 | <i>Lolium multiflorum</i> Lamk. | |
| | | 绒毛草 | <i>Holcus lanatus</i> L. | 球茎草芦 | <i>Phalaris tuberosa</i> cv. <i>Weining</i> | |
| | | 𬟁草 | <i>Phalaris arundinacea</i> L. | 白车轴草(白三叶) | <i>Trifolium repens</i> L. | |
| | | 狗牙根 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Persoon | 红车轴草(红三叶) | <i>Trifolium pratense</i> L. | |
| | | 草地早熟禾 | <i>Poa pratensis</i> L. | 紫花苜蓿* | <i>Medicago sativa</i> L. | *更适宜于种植在石灰土中 |
| | | 白车轴草(白三叶) | <i>Trifolium repens</i> L. | 箭筈豌豆 | <i>Vicia sativa</i> L. | |
| | | 红车轴草(红三叶) | <i>Trifolium pratense</i> L. | 光叶紫花苜 | <i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh. | |
| | | 百脉根 | <i>Lotus corniculatus</i> L. | 东方山羊豆 | <i>Galega orientalis</i> Lam. | |
| | | 紫云英 | <i>Astragalus sinicus</i> L. | 长叶车前 | <i>Plantago lanceolata</i> L. | |
| 毕节市黔西市、织金县、 | | 鸭茅 | <i>Dactylis glomerata</i> L. | 鸭茅 | <i>Dactylis glomerata</i> L. | |
| | | 多年生黑麦草 | <i>Perennial Ryegrass</i> | 多年生黑麦草 | <i>Perennial Ryegrass</i> | |
| | | 苇状羊茅 | <i>Festuca elata</i> Keng ex E. B. Alexeev | 苇状羊茅 | <i>Festuca elata</i> Keng ex E. B. Alexeev | |
| | | 球茎草芦 | <i>Phalaris tuberosa</i> cv. <i>Weining</i> | 多花黑麦草 | <i>Lolium multiflorum</i> Lamk. | |
| | | 绒毛草 | <i>Holcus lanatus</i> L. | 球茎草芦 | <i>Phalaris tuberosa</i> cv. <i>Weining</i> | |

| 草地建植分区 | 涉及行政区 | 主推生态草种 | | 主推牧草草种 | | 备注 |
|--------------------|---|-----------|--------------------------------------|-----------|--|--------------|
| | | 种 | 学名 | 种 | 学名 | |
| 中高海拔区(1200~1500 m) | 大方县、安顺市平坝区、普定县、西秀区、紫云县、镇宁县，贵阳市息烽县、开阳县、修文县、清镇市、白云区、乌当区、观山湖区，黔西南州兴义市、晴隆县、兴仁市、安龙县、望谟县、贞丰县，黔南州龙里县、贵定县、惠水县、长顺县、都匀市、瓮安县、福泉市等县(市、区)的部分地区 | 𬟁草 | <i>Phalaris arundinacea</i> L. | 无芒雀麦 | <i>Bromus inermis</i> Leyss. | |
| | | 狗牙根 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Persoon | 白车轴草(白三叶) | <i>Trifolium repens</i> L. | |
| | | 草地早熟禾 | <i>Poa pratensis</i> L. | 红车轴草(红三叶) | <i>Trifolium pratense</i> L. | |
| | | 白车轴草(白三叶) | <i>Trifolium repens</i> L. | 紫花苜蓿* | <i>Medicago sativa</i> L. | *更适宜于种植在石灰土中 |
| | | 红车轴草(红三叶) | <i>Trifolium pratense</i> L. | 箭筈豌豆 | <i>Vicia sativa</i> L. | |
| | | 百脉根 | <i>Lotus corniculatus</i> L. | 光叶紫花苜 | <i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh. | |
| | | 紫云英 | <i>Astragalus sinicus</i> L. | 长叶车前 | <i>Plantago lanceolata</i> L. | |
| | | | | 菊苣 | <i>Cichorium intybus</i> L. | |
| | | | | 东方山羊豆 | <i>Galega orientalis</i> Lam. | |
| | | | | 金荞麦 | <i>Fagopyrum dibotrys</i> (D. Don) Hara | |

| 草地建植分区 | 涉及行政区 | 主推生态草种 | | 主推牧草草种 | | 备注 |
|---------------------|---|-----------|--|-----------|--|--------------|
| | | 种 | 学名 | 种 | 学名 | |
| 中低海拔区(800 ~ 1200 m) | 毕节市金沙县, 遵义市仁怀市、播州区、汇川区、红花岗区、习水县、桐梓县、道真县、正安县、务川县、绥阳县、湄潭县、凤冈县、余庆县, 贵阳市息烽县、开阳县、云岩区、南明区、花溪区, 黔南州都匀市、瓮安县、福泉市、贵定县、麻江县、惠水县、平塘县、独山县, 黔西南州贞丰县、册亨县, 安顺市镇宁县、紫云县, 铜仁市德江县、印江县、石阡县, 以及黔东南州镇远县、施秉县、黄平县、凯里市、丹寨县、台江县、黎平县、雷山县等县(市、区)的部分地区 | 宽叶雀稗 | <i>Paspalum wettsteinii</i> Hack. | 鸭茅 | <i>Dactylis glomerata</i> L. | |
| | | 毛花雀稗 | <i>Paspalum dilatatum</i> Poir. | 苇状羊茅 | <i>Festuca elata</i> Keng ex E. B. Alexeev | |
| | | 巴哈雀稗 | <i>Paspalum notatum</i> Flüggé | 宽叶雀稗 | <i>Paspalum wettsteinii</i> Hack. | |
| | | 狗牙根 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Persoon | 无芒雀麦 | <i>Bromus inermis</i> Leyss. | |
| | | 草地早熟禾 | <i>Poa pratensis</i> L. | 杂交象草 | <i>(Pennisetum americanum × P. purpureum) × P. durpureum</i> | |
| | | 剪股颖 | <i>Agrostis matsumurae</i> Hack. | 甜象草 | <i>Pennisetum purpureum</i> Schum | |
| | | 白车轴草(白三叶) | <i>Trifolium repens</i> L. | 多花黑麦草 | <i>Lolium multiflorum</i> Lamk. | |
| | | 红车轴草(红三叶) | <i>Trifolium pratense</i> L. | 苏丹草 | <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf | |
| | | 百脉根 | <i>Lotus corniculatus</i> L. | 高丹草 | <i>Sorghum bicolor × sudanense</i> | |
| | | 紫云英 | <i>Astragalus sinicus</i> L. | 白车轴草(白三叶) | <i>Trifolium repens</i> L. | |
| | | | | 紫花苜蓿* | <i>Medicago sativa</i> L. | *更适宜于种植在石灰土中 |
| | | | | 光叶紫花苜 | <i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh. | |
| | | | | 东方山羊豆 | <i>Galega orientalis</i> Lam. | |
| | | | | 长叶车前 | <i>Plantago lanceolata</i> L. | |
| | | | | 菊苣 | <i>Cichorium intybus</i> L. | |
| | | | | 金荞麦 | <i>Fagopyrum dibotrys</i> (D.Don) Hara | |
| | | 鸭茅 | <i>Dactylis glomerata</i> L. | 鸭茅 | <i>Dactylis glomerata</i> L. | |
| | | 苇状羊茅 | <i>Festuca elata</i> Keng ex E. B. Alexeev | 苇状羊茅 | <i>Festuca elata</i> Keng ex E. B. Alexeev | |
| | | 扁穗牛鞭草 | <i>Hemarthria compressa</i> (L. f.) R. Br. | 扁穗牛鞭草 | <i>Hemarthria compressa</i> (L. f.) R. Br. | |
| | | 牛鞭草 | <i>Hemarthria sibirica</i> (Gand.) Ohwi | 牛鞭草 | <i>Hemarthria sibirica</i> (Gand.) Ohwi | |
| | | 宽叶雀稗 | <i>Paspalum wettsteinii</i> Hack. | 宽叶雀稗 | <i>Paspalum wettsteinii</i> Hack. | |
| | | 毛花雀稗 | <i>Paspalum dilatatum</i> Poir. | 毛花雀稗 | <i>Paspalum dilatatum</i> Poir. | |

| 草地建植分区 | 涉及行政区 | 主推生态草种 | | 主推牧草草种 | | 备注 |
|----------------|---|--------|--|-----------|--|--------------|
| | | 种 | 学名 | 种 | 学名 | |
| 低海拔区(800 m 以下) | 铜仁市沿河县、德江县、思南县、印江县、松桃县、江口县、碧江区、万山区、玉屏县、石阡县，遵义市赤水市、习水县、仁怀市、桐梓县、正安县、道真县、务川县、凤冈县、红花岗区、湄潭县，黔东南州岑巩县、镇远县、黄平县、施秉县、三穗县、天柱县、凯里市、台江县、剑河县、锦屏县、榕江县、从江县、黎平县，黔南州麻江县、三都县、荔波县、罗甸县，黔西南州贞丰县、册亨县、望谟县等县（市、区）的部分地区 | 巴哈雀稗 | <i>Paspalum notatum</i> Flüggé | 巴哈雀稗 | <i>Paspalum notatum</i> Flüggé | |
| | | 非洲狗尾草 | <i>Setaria anceps</i> Stapf. | 非洲狗尾草 | <i>Setaria anceps</i> Stapf. | |
| | | 狗牙根 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Persoon | 杂交狼尾草 | <i>Pennisetum glaucum</i> × <i>purpureum</i> | |
| | | 剪股颖 | <i>Agrostis matsumurae</i> Hack. | 杂交象草 | (<i>Pennisetum americanum</i> × <i>P. purpureum</i>) × <i>P. durpureum</i> | |
| | | 细叶结缕草 | <i>Zoysia tenuifolia</i> Willd. ex Trin. | 甜象草 | <i>Pennisetum purpureum</i> Schum | |
| | | 假俭草 | <i>Eremochloa ophiurooides</i> (Munro) Hack. | 多花黑麦草 | <i>Lolium multiflorum</i> Lamk. | |
| | | 柱花草 | <i>Stylosanthes guianensis</i> SW. | 苏丹草 | <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf | |
| | | 百脉根 | <i>Lotus corniculatus</i> L. | 高丹草 | <i>Sorghum bicolor</i> × <i>sudanense</i> | |
| | | 紫云英 | <i>Astragalus sinicus</i> L. | 白车轴草(白三叶) | <i>Trifolium repens</i> L. | |
| | | | | 紫花苜蓿* | <i>Medicago sativa</i> L. | *更适宜于种植在石灰土中 |
| | | | | 光叶紫花苜 | <i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh. | |
| | | | | 长叶车前 | <i>Plantago lanceolata</i> L. | |
| | | | | 菊苣 | <i>Cichorium intybus</i> L. | |
| | | | | 金荞麦 | <i>Fagopyrum dibotrys</i> (D.Don) Hara | |
| | | | | 绿叶山蚂蝗 | <i>Desmodium intortum</i> (Mill.) Urb. | |
| | | | | 大翼豆 | <i>Macroptilium lathyroides</i> (L.) Urb. | |
| | | | | 柱花草 | <i>Stylosanthes guianensis</i> SW. | |

附表2

贵州省慎重发展草品种清单

| 序号 | 种 | 品种 | 学名 |
|----|-------|----------|---|
| 1 | 扁穗雀麦 | 江夏扁穗雀麦 | <i>Bromus cartharticus</i> Vahl. 'Jiangxia' |
| 2 | 狗牙根 | 阳江狗牙根 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. 'Yangjiang' |
| 3 | | 川南狗牙根 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. 'Chuannan' |
| 4 | | 鄂引3号狗牙根 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. 'E Yin No.3' |
| 5 | 鸭茅 | 波特鸭茅 | <i>Dactylis glomerata</i> L. 'Porto' |
| 6 | | 大使鸭茅 | <i>Dactylis glomerata</i> L. 'Ambassador' |
| 7 | | 德娜塔鸭茅 | <i>Dactylis glomerata</i> L. 'Donata' |
| 8 | | 瓦娜鸭茅 | <i>Dactylis glomerata</i> L. 'Wana' |
| 9 | | 滇北鸭茅 | <i>Dactylis glomerata</i> L. 'Dianbei' |
| 10 | | 英都仕鸭茅 | <i>Dactylis glomerata</i> L. 'Endurance' |
| 11 | | 阿鲁巴鸭茅 | <i>Dactylis glomerata</i> L. 'Aldebaran' |
| 12 | | 斯巴达鸭茅 | <i>Dactylis glomerata</i> L. 'Sparta' |
| 13 | 画眉草 | 寻甸梅氏画眉草 | <i>Eragrostis mairei</i> Hack 'Xundian' |
| 14 | 类蜀黍 | 玉草号杂交大刍草 | (<i>Zea mays</i> × <i>Zea perennis</i> L.) × <i>Zea perennis</i> L. 'Yucao No.1' |
| 15 | 高羊茅 | 维加斯高羊茅 | <i>Fescuca arundinacea</i> Schreb. 'Vegas' |
| 16 | | 沪坪1号高羊茅 | <i>Fescuca arundinacea</i> Schreb. 'Huping No.1' |
| 17 | 苇状羊茅 | 约翰斯顿苇状羊茅 | <i>Fescuca arundinacea</i> Schreb. 'Johnstone' |
| 18 | 扁穗牛鞭草 | 雅安扁穗牛鞭草 | <i>Hemarthria compressa</i> (L. f.) R. Br. 'Yaan' |
| 19 | 西南异燕麦 | 康巴变绿异燕麦 | <i>Helictotrichon virescens</i> (Nees ex steud.) Henr. 'Kangba' |
| 20 | 多花黑麦草 | 达伯瑞多花黑麦草 | <i>Lolium multiflorum</i> Lam. 'Double Barrel' |
| 21 | | 阿德纳多花黑麦草 | <i>Lolium multiflorum</i> Lam. 'Adrenalin' |
| 22 | | 杰特多花黑麦草 | <i>Lolium multiflorum</i> Lam. 'Jivet' |
| 23 | | 剑宝多花黑麦草 | <i>Lolium multiflorum</i> Lam. 'Jumbo' |

| | | | |
|----|--------|------------|--|
| 24 | | 川农1号多花黑麦草 | <i>Lolium multiflorum</i> Lam. 'Chuannong No.1' |
| 25 | 多年生黑麦草 | 麦迪多年生黑麦草 | <i>Lolium perenne</i> L. 'Mathilde' |
| 26 | | 图兰朵多年生黑麦草 | <i>Lolium perenne</i> L. 'Turandot' |
| 27 | | 格兰丹迪多年生黑麦草 | <i>Lolium perenne</i> L. 'Grand Daddy' |
| 28 | | 泰特Ⅱ号杂交黑麦草 | <i>Lolium x bucheanum</i> 'Tetrelite II' |
| 29 | 羊茅黑麦草 | 拜伦羊茅黑麦草 | <i>Festulolium braunii</i> L. 'Perun' |
| 30 | 象草 | 苏牧2号象草 | <i>Pennisetum purpureum</i> Schum. 'Sumu No.2' |
| 31 | 小花碱茅 | 同德小花碱茅 | <i>Puccinellia tenuiflora</i> (Griseb.) Scribn. & Merr. 'Tongde' |
| 32 | 鹅观草 | 川中鹅观草 | <i>Roegneria kamoji</i> Keng 'ChuanZhong' |
| 33 | 结缕草 | 上海结缕草 | <i>Zoysia japonica</i> Steud. 'Shanghai' |
| 34 | 南苜蓿 | 楚雄南苜蓿 | <i>Medicago hispida</i> Gaertn. 'Chuxiong' |
| 35 | | 淮扬金花菜 | <i>Medicago hispida</i> Gaertn. 'Huaiyang' |
| 36 | 紫花苜蓿 | 威斯顿紫花苜蓿 | <i>Medicago sativa</i> L. 'Weston' |
| 37 | 庭菖蒲 | 川西庭菖蒲 | <i>Sisyrinchium rosulatum</i> bickn 'Chuanxi' |

注：

1. 中性草品种需引种驯化3年以上。
2. 数据主要来源《中国审定草品种集》

附表3

贵州省不宜发展草品种清单

| 序号 | 种 | 品种 | 学名 |
|----|-------|----------|--|
| 1 | 扁穗冰草 | 杜尔伯特扁穗冰草 | <i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn. 'Duerbote' |
| 2 | | 塔乌库姆冰草 | <i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn. 'Tawukumu' |
| 3 | 根茎冰草 | 白音希勒根茎冰草 | <i>Agropyron michnoi</i> Roshev. cv. Baiyinxile |
| 4 | 小黑麦 | 石大1号小黑麦 | <i>Triticosecale Wittmack</i> 'Shida No.1' |
| 5 | 野大麦 | 萨尔图野大麦 | <i>Hordeum brevisubulatum</i> (Trin.) Link "Saertu" |
| 6 | 贫花鹅观草 | 同德贫花鹅观草 | <i>Roegneria pauciflora</i> (Schwein) Hylander 'Tongde' |
| 7 | 直穗鹅观草 | 林西直穗鹅观草 | <i>Roegneria turczaninovii</i> (Drob) Nevski. 'Linxi' |
| 8 | 远东芨芨草 | 京西远东芨芨草 | <i>Achnatherum extremiorientale</i> (Hara) Keng. 'Jingxi' |
| 9 | 朝鲜碱茅 | 吉农2号朝鲜碱茅 | <i>Puccinellia chinampoensis</i> 'Jinong No.2' |
| 10 | 羊草 | 中科1号 | <i>Leymus chinensis</i> (Trin.) Tzvel. 'Zhongke No.1' |
| 11 | 燕麦 | 陇燕3号燕麦 | <i>Avena sativa</i> L. 'Longyan No.3' |
| 12 | 莜麦 | 青引3号莜麦 | <i>Avena nuda</i> L. 'Qingyin No.3' |
| 13 | 毛穗赖草 | 乌拉特毛穗赖草 | <i>Leymus paboanus</i> (Claus) Pilger. 'Wulate' |
| 14 | 新麦草 | 蒙农4号新麦草 | <i>Psathyrostachys juncea</i> (Fisch.) Nevski 'Mengnong No. 4' |
| 15 | 垂穗披碱草 | 阿坝垂穗披碱草 | <i>Elymus nutans</i> Griseb. 'Aba' |
| 16 | 无芒披碱草 | 同德无芒披碱草 | <i>Elymus sinosubmuticus</i> Keng f. 'Tongde' |
| 17 | 无芒隐子草 | 腾格里无芒隐子草 | <i>Cleistogenes songorica</i> (Rosheb.) Ohwi 'Tenggeli' |
| 18 | 老芒麦 | 康巴老芒麦 | <i>Elymus sibiricus</i> L. 'Kangba' |
| 19 | 偃麦草 | 京草1号偃麦草 | <i>Elytrigia repens</i> L. Nevski 'Jing cao No.1' |
| 20 | | 京草2号偃麦草 | <i>Elytrigia repens</i> L. Nevski 'Jing cao No.2' |
| 21 | | 新偃1号偃麦草 | <i>Elytrigia repens</i> (Linn.) Nevski 'Xinyan No.1' |
| 22 | | 邯郸狗牙根 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. 'Handan' |

| 序号 | 种 | 品种 | 学名 |
|----|--------|------------|--|
| 23 | 狗牙根 | 保定狗牙根 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. 'Baoding' |
| 24 | | 新农3号 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. 'Xingnong No.3' |
| 25 | 稗 | 长白稗 | <i>Echinochloa crusgalli</i> L. Beauv. 'Changbai' |
| 26 | 短毛野青茅 | 韩国涟川短毛野青茅 | <i>Deyeuxia arundinacea</i> P. Beauv. 'Hanguolianchuan' |
| 27 | 野古草 | 京西野古草 | <i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) Tanaka 'Jingxi' |
| 28 | 紫花苜蓿 | 甘农5号紫花苜蓿 | <i>Medicago sativa</i> L.'Gannong No.5' |
| 29 | | 甘农6号紫花苜蓿 | <i>Medicago sativa</i> L.'Gannong No.6' |
| 30 | | 公农5号紫花苜蓿 | <i>Medicago sativa</i> L.'Gongnnong No.5' |
| 31 | | 清水紫花苜蓿 | <i>Medicago sativa</i> L.'Qingshui' |
| 32 | | 中草3号紫花苜蓿 | <i>Medicago sativa</i> L.'Zhongcao No.3' |
| 33 | | 中苜6号紫花苜蓿 | <i>Medicago sativa</i> L.'Zhongmu No.6' |
| 34 | | 新牧4号紫花苜蓿 | <i>Medicago sativa</i> L.'Xinmu No.4' |
| 35 | | 东苜1号紫花苜蓿 | <i>Medicago sativa</i> L.'Dongmu No.1' |
| 36 | | 龙牧808紫花苜蓿 | <i>Medicago sativa</i> L.'Longmu No.808' |
| 37 | 黄花苜蓿 | 秋柳黄花苜蓿 | <i>Medicago falcata</i> L. 'Syulinskaya' |
| 38 | 杂花苜蓿 | 公农4号杂花苜蓿 | <i>Medicago varia</i> Martin 'Gongnon No.4' |
| 39 | | 辉腾原杂花苜蓿 | <i>Medicago varia</i> Martin 'Huitengyuan' |
| 40 | 红豆草 | 奇台红豆草 | <i>Onobrychis viciaefolia</i> Scop. 'Qitai' |
| 41 | 扁蓿豆 | 土默特扁蓿豆 | <i>Medicago ruthenica</i> (L.) sojak 'Tumote' |
| 42 | 达乌里胡枝子 | 林西达乌里胡枝子 | <i>Lespedeza davurica</i> (Laxm.) Schindl. 'Linxi' |
| 43 | | 陇东达乌里胡枝子 | <i>Lespedeza davurica</i> (Laxm.) Schindl. 'Longdong' |
| 44 | | 晋农1号达乌里胡枝子 | <i>Lespedeza davurica</i> (Laxm.) Schindl. 'Jinnong No.1' |
| 45 | 猫尾草 | 克力玛猫尾草 | <i>Phleum pratense</i> L. 'Climax' |
| 46 | 沙打旺 | 中沙2号沙打旺 | <i>Astragalus adsurgens</i> Pall. 'Zhongsha No.2' |

| 序号 | 种 | 品种 | 学名 |
|----|--------|------------|---|
| 47 | 沙打旺 | 绿帝1号沙打旺 | <i>Astragalus adsurgens</i> Pall. 'Lvdi No.1' |
| 48 | 多变小冠花 | 彩云多变小冠花 | <i>Coronilla varia</i> L. 'Caiyun' |
| 49 | 柠条锦鸡儿 | 鄂尔多斯柠条锦鸡儿 | <i>Caragana korshinskii</i> Kom. 'Eerduosi' |
| 50 | 中间锦鸡儿 | 鄂尔多斯中间锦鸡儿 | <i>Caragana intermedia</i> Kuang. 'Eerduosi' |
| 51 | 葛 | 京西葛 | <i>Pueraria lobata</i> (Willd) Ohwi. 'Jingxi' |
| 52 | 黄花补血草 | 陇中黄花补血草 | <i>Limonium aureum</i> (L.) Hill 'Longzhong' |
| 53 | 黄花草木樨 | 公农黄花草木樨 | <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam. 'Gongnong' |
| 54 | 白花草木樨 | 公农白花草木樨 | <i>Melilotus albus</i> Medic. ex Desr 'Gongnong' |
| 55 | 草木樨状黄芪 | 鄂尔多斯草木樨状黄芪 | <i>Astragalus melilotoides</i> Pall. 'Eerduosi' |
| 56 | 秣食豆 | 牡丹江秣食豆 | <i>Glycine max</i> (L.) Merr 'Mudanjiang' |
| 57 | | 松嫩秣食豆 | <i>Glycine max</i> (L.) Merr 'Songnen' |
| 58 | 地榆 | 伊敏河地榆 | <i>Sanguisorba officinalis</i> L. 'Yi Minhe' |
| 59 | 扁桃 | 乌拉特柄扁桃 | <i>Prunus pedunculata</i> (Pall) Maxim. 'Wulate' |
| 60 | 驼绒藜 | 乌兰察布型驼绒藜 | <i>Ceratodes arborescens</i> (Losinsk.) Tsien et. C. G. Ma 'Wulanchabuxing' |
| 61 | 罗布麻 | 松原罗布麻 | <i>Apocynum venetum</i> L. 'Songyuan' |
| 62 | 大颖草 | 青南大颖草 | <i>Roegneria grandiglumis</i> 'Qingnan' |

注：该清单草品种不宜在全省范围内发展。数据主要来源《2018年全国草品种审定委员会审定通过草品种名录》《全国草品种审定登记情况统计表（1987-2014）》《2022年全国草品种审定委员会审定通过草品种名录》《中国审定草品种集》。